

MELLIS VET®

MELOXICAM

USO VETERINÁRIO

Anti-inflamatório não esteroidal de uso oral para cães

Fórmula

Cada comprimido de Mellis Vet® 0,5 mg contém:

Meloxicam 0,5 mg
Excipientes q.s.p. 70 mg

Cada comprimido de Mellis Vet® 2,0 mg contém:

Meloxicam 2,0 mg
Excipientes q.s.p. 280 mg

Cada comprimido de Mellis Vet® 3,0 mg contém:

Meloxicam 3,0 mg
Excipientes q.s.p. 420 mg

Cada comprimido de Mellis Vet® 4,0 mg contém:

Meloxicam 4,0 mg
Excipientes q.s.p. 560 mg

Informações técnicas

O meloxicam é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), inibidor preferencial da enzima cicloxigenase do tipo 2 (COX2), pertencente à classe dos oxicams, que inibe a produção de prostaglandinas envolvidas no processo inflamatório. O fármaco apresenta ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Meloxicam é rapidamente absorvido por via oral, atinge pico plasmático adequado em até 7 horas e pode ser administrado junto com o alimento uma vez ao dia. É eliminado de forma inativa nas fezes, na urina e na bile.

Indicações

Mellis Vet® é indicado como analgésico e anti-inflamatório para cães.

A EFICÁCIA DESTE PRODUTO NÃO FOI AVALIADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).

Posologia e modo de usar

Mellis Vet® deve ser administrado exclusivamente pela via oral. A dose recomendada é de 0,2 mg/kg na primeira dose, seguido de 0,1 mg/kg a cada 24 horas por até 13 dias de acordo com a tabela abaixo.

| Peso do animal em kg | Primeiro dia 0,2 mg/kg 1 vez ao dia | Segundo e demais dias 0,1 mg/kg 1 vez ao dia |
|----------------------|--|---|
| 5 kg | 2 comprimidos de 0,5 mg | 1 comprimido de 0,5 mg |
| 10 kg | 1 comprimido de 2,0 mg | 1/2 comprimido de 2,0 mg |
| 15 kg | 1 comprimido de 3,0 mg | 1/2 comprimido de 3,0 mg |
| 20 kg | 1 comprimido de 4,0 mg | 1/2 comprimido de 4,0 mg |
| 30 kg | 2 comprimidos de 3,0 mg | 1 comprimido de 3,0 mg |
| 40 kg | 2 comprimidos de 4,0 mg | 1 comprimido de 4,0 mg |

De acordo com o estudo de eficácia realizado com cães, o produto Mellis Vet® foi considerado 100% eficaz para o controle da dor aguda e da inflamação, quando utilizado a cada 24 horas por 7 dias, sendo a dose inicial de 0,2 mg/kg (dia 1), seguido pela dose de 0,1 mg/kg nos dias subsequentes, em cadelas submetidas a ovariossalpingo-histerectomia (OSH). O tratamento poderá ser prolongado até o 13º dia, de acordo com os resultados obtidos pelo estudo de segurança realizado com o produto.

ME243151 - 240 x 150 mm - PHC 3557

Contraindicações

O produto não deve ser administrado a cães com hipersensibilidade ao meloxicam ou a qualquer componente da fórmula. Não é recomendado para fêmeas prenhes, lactantes nem a cães com menos de 12 meses de idade, pois ainda não foram realizados estudos com esses grupos. Mellis Vet®, assim como todos os anti-inflamatórios não esteroidais, não é recomendado para cães portadores de distúrbios hemorrágicos, doenças cardiovasculares, hepáticas, renais e gastrointestinais, nem a animais desidratados, hipovolêmicos e hipotensos.

Interações medicamentosas

Recomenda-se evitar o uso concomitante de Mellis Vet® com anticoagulantes, outros anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, diuréticos, inibidores da enzima convertora de angiotensina (IECAs) e fármacos potencialmente nefrotóxicos, devido ao risco de aumento da incidência de efeitos adversos.

Efeitos adversos

Diante do estudo de segurança realizado com cães, o produto Mellis Vet® demonstrou-se seguro, quando ministrado nas doses recomendadas, por até 13 dias consecutivos. Durante esse período, não foram observadas alterações em exames hematológicos e bioquímicos. Reações como êmese, dor abdominal de leve a moderada, hiporexia e fezes com sangue podem ser observadas, porém com baixa incidência quando o fármaco é administrado conforme as recomendações da bula. Quando utilizado em sobredose e por período superior ao indicado, poderá causar apatia, dor abdominal de leve a intensa, êmese, alteração da consistência das fezes, hiporexia e melena.

Precauções

A segurança de Mellis Vet® não foi testada em cadelas gestantes ou lactantes, cães usados para procriação nem em cães com idade abaixo de 1 ano.

Intoxicação e superdosagem

Em casos de intoxicação ou superdosagem, procurar um Médico Veterinário para avaliação e tratamento suporte. Reações como apatia, dor abdominal de leve a intensa, êmese, alteração da consistência das fezes, hiporexia e melena foram observadas em cães que receberam duas vezes a dose máxima terapêutica recomendada.

Advertências

Produtos de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal. Não foram realizados estudos de segurança com cães abaixo de 1 ano de idade, fêmeas prenhes e lactantes.

Apresentação

Blister contendo 10 comprimidos bissulcados.

Blister contendo 4 comprimidos bissulcados (AMOSTRA GRÁTIS).

Cuidados de conservação

Conservar o produto em local seco, sob temperatura ambiente (de 15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em casos de ingestão acidental, procurar um médico e levar a embalagem do produto.

Partida, data de fabricação e de vencimento: vide embalagem.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Produto licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº 21/2020 em 29/01/2020.

Proprietário e fabricante

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.

Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039 Bragança Paulista - SP

CEP: 12929-600 - CNPJ: 49.475.833/0018-46 - SAC: 0800 941 5566

Responsável técnica: Daniela Ziolkowski, CRF-SP 29.486.

Vencimento: 24 meses após a data de fabricação.

